

TCS Tumeurs de l'ethmoïde

Monsieur B, ancien ébéniste en retraite, signale depuis deux semaines un écoulement narinaire gauche, séro-sanglant. Il signale également des céphalées inhabituelles apparues un mois plus tôt, mal calmées par les antalgiques usuels. L'examen clinique retrouve une anosmie.

DIAGNOSTIC

| Si vous pensez à | Et qu'alors vous trouvez | L'effet sur votre hypothèse diagnostique est le suivant |
|--------------------------------------|-----------------------------|---|
| Méningiome de la gouttière olfactive | Larmolement | -2 -1 0 +1 +2 |
| Muocèle sphénoïdale | Diplopie | -2 -1 0 +1 +2 |
| Adénocarcinome de l'ethmoïde | Syndrome frontal | -2 -1 0 +1 +2 |
| Tumeur de l'hypophyse | Douleur hémiface inférieure | -2 -1 0 +1 +2 |
| Anévrisme du sinus caverneux | Masse dans cavum | -2 -1 0 +1 +2 |

Cochez la proposition qui vous semble adéquate :

- -2 l'hypothèse est pratiquement éliminée
- -1 l'hypothèse devient moins probable
- 0 l'information n'a aucun effet sur l'hypothèse
- +1 l'hypothèse devient plus probable
- +2 il ne peut s'agir pratiquement que de cette hypothèse

INVESTIGATION

| Si vous pensiez faire | Et qu'alors vous trouvez (nouvelle information obtenue par l'anamnèse, l'examen clinique, l'imagerie ou un examen complémentaire) | L'effet sur la nécessité de demander ce test est le suivant |
|-----------------------------|--|---|
| Radios des sinus de la face | Moria | -2 -1 0 +1 +2 |
| Scanner crânio- facial | Ganglions cervicaux | -2 -1 0 +1 +2 |
| IRM crânio- faciale | Tuméfaction paupière | -2 -1 0 +1 +2 |
| Endoscopie nasale | Obstruction narinaire | -2 -1 0 +1 +2 |
| Bilan endocrinien | Adynamie | -2 -1 0 +1 +2 |

Cochez la proposition qui vous semble adéquate :

- - 2 l'hypothèse est pratiquement éliminée
- - 1 l'hypothèse devient moins probable
- 0 l'information n'a aucun effet sur l'hypothèse
- +1 l'hypothèse devient plus probable
- +2 il ne peut s'agir pratiquement que de cette hypothèse

TRAITEMENT

| Si vous pensiez faire | Et qu'alors vous trouvez (nouvelle information obtenue par l'anamnèse, l'examen clinique, l'imagerie ou un examen complémentaire) | L'effet sur la pertinence de réaliser ce geste est le suivant |
|------------------------------------|--|--|
| Chirurgie par voie basse exclusive | Atteinte lame criblée | -2 -1 0 +1 +2 |
| Chirurgie par voie endoscopique | Tumeur de stade T4 | -2 -1 0 +1 +2 |
| Chirurgie à double équipe | Tumeur < 1 cm | -2 -1 0 +1 +2 |
| Chimiothérapie d'induction | Thrombopénie | -2 -1 0 +1 +2 |
| Chimiothérapie complémentaire | Altération état général | -2 -1 0 +1 +2 |
| Radiothérapie | Recoupes osseuses + | -2 -1 0 +1 +2 |

Cochez la proposition qui vous semble adéquate :

- - 2 l'hypothèse est pratiquement éliminée
- - 1 l'hypothèse devient moins probable
- 0 l'information n'a aucun effet sur l'hypothèse
- +1 l'hypothèse devient plus probable
- +2 il ne peut s'agir pratiquement que de cette hypothèse